

ДюПон™ Икуейшън® Про - фунгицид



Обща информация

КОМБИНИРАН, ЛОКАЛНО-СИСТЕМЕН И КОНТАКТЕН ФУНГИЦИД ЗА БОРБА С БОЛЕСТИТЕ ПРИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЛОЗЯ

>> **Съдържание:** 300 г/кг симоксанил + 225 г/кг фамоксадон.

>> **Формулация:** Водоразтворими гранули

>> **Опаковка:** 400 г

Култура	Вредител	Доза	Момент на приложение
Лозя	Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) Антракноза (<i>Gloeosporium ampelobagum</i>) Екскориоза (<i>Phomopsis viticola</i>)	0,04 % (40 г/дка)	Предпазващо или в ранни стадии на инфекцията, преди видимите симптоми на болестта.
Картофи	Мана (<i>Phytophthora infestans</i>) Алтернария (<i>Alternaria solani</i>)	40 г/дка	Предпазващо или в ранни стадии на инфекцията, преди видимите симптоми на болестта.
Домати	Мана (<i>Phytophthora infestans</i>) Алтернария (<i>Alternaria solani</i>)	0,04 % (40 г/дка)	Предпазващо или в ранни стадии на инфекцията, преди видимите симптоми на болестта.
Краставици	Мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Алтернария (<i>Alternaria cucumerina</i>)	0,04 % (40 г/дка)	Предпазващо или в ранни стадии на инфекцията, преди видимите симптоми на болестта.



Приложение при лозя

Икуейшън® Про - 0,04 % (40 г/дка)



- >> При лозя е особено ефективен за критичната фаза за поява на мана - начало на цъфтеж до формиране на зърна.
- >> Препоръчителен обем на работния разтвор: за лозя - 100 - 150 л/дка.
- >> Интервали на третиране: при нормални климатични условия интервалът между отделните третираня е 14 дни.
- >> Максимален брой третираня за сезон: лозя - 3
- >> Карантинен срок: 28 дни



ДюПон[™] Икуейшън[®] Про - фунгицид

DU PONT

Приложение при домати и краставици

Икуейшън[®] Про - 0,04 % (40 г/дка)



- >> Икуейшън[®] Про може да се прилага от началното развитие на растенията (3 - 5 лист) до беритбения период.
- >> Препоръчителен обем на работния разтвор: 20 - 60 л/дка
- >> Интервали на третиране: 10 - 12 дни. При период с чести превалявания, което води до много кратък инкубационен период и висок риск от инфекции, интервалът може да се намали.
- >> Максимален брой третираня за сезон: домати: 4; краставици: 3
- >> Карантинен срок: домати: 3; - краставици: 7

Приложение при картофи

Икуейшън® Про - 0,04 % (40 г/дка)



- >> Икуейшън® Про може да се прилага от началното развитие на растенията (3 - 5 лист) до беритбения период;
- >> Препоръчителен обем на работния разтвор: 20 - 60 л/дка
- >> Интервали на третиране: 10 - 12 дни. При период с чести превалявания, което води до много кратък инкубационен период и висок риск от инфекции, интервалът може да се намали.
- >> Максимален брой третираня за сезон: 4 - 6;
- >> Карантинен срок: 14 дни



ДюПон™ Икуейшън® Про - фунгицид

DU PONT

Резистентност и смесимост

>> Многократното използване на някои фунгициди на база фениламиди (металаксил, беналаксил) може да доведе до поява на резистентност у патогените, което предполага задължително редуване във фунгицидната програма на продукти с различен начин на действие, като Икуейшън® Про, който не само, че не създава риск от възникване на резистентност, но и е ефективен срещу щамове патогени, резистентни на фениламидни фунгициди. Извършването на 2-3 третириания с Икуейшън® Про и Корсейт® Р ВП на сезон намалява риска от поява на резистентност.

>> Икуейшън® Про може да се редува с други фунгициди против мана. В този случай при определяне на интервала на третиране, трябва да се вземат под внимание качествата на другите продукти. В случай, че след използване на контактен фунгицид падне дъжд, трябва веднага да се третира с Икуейшън® Про.

СМЕСИМОСТ

- >> Икуейшън® Про е смесим с продукти за растителна защита, които имат неутрална или кисела реакция.
- >> Препоръчва се да се направи предварителен тест за смесимост и да се следват указанията за смесимост върху етикета на партнирания продукт.
- >> Икуейшън® Про не трябва да се смесва с продукти с алкална реакция.




ДюПон™ Икуейшън® Про - фунгицид

DU PONT

Начин на действие

- >> Икуейшън® Про е комбинация от две активни вещества – фамоксадон и симоксанил.
- >> Фамоксадонът притежава контактно и предпазно действие. Той се свързва здраво с липидните слоеве на кутикулата на растителните части и блокира диференцирането на спорангиите в зооспори.
- >> Фамоксадон, за разлика от другите контактни фунгициди се абсорбира в голяма степен (75-80 %) от по-дълбоките слоеве на кутикулата, което води до изключителна устойчивост на отмиване. При паднал дъжд скоро след третиране (2 часа), разтвора не само че не се отмива, но се получава и преразпределение и реактивиране на активното вещество върху растителната повърхност.
- >> Симоксанилът притежава локално-системно действие. Прониква бързо в растителните тъкани, блокира покълването на зооспорите, както и развитието на мицела. По този начин Икуейшън® Про действа върху всички стадии на развитие на патогените.



ДюПон™ Икуейшън® Про - фунгицид

DU PONT

Предимства

- >> Комбинация от две активни вещества с доказан синергизъм.
- >> Притежава превантивно, лечебно и антиспорулантно действие.
- >> Без установена резистентност при патогените, срещу които е насочена борбата. Подходящ за използване в програми за управление на резистентността.
- >> Висока устойчивост на отмиване от дъжд.
- >> Не влияе върху ферментационните процеси на виното, не оказва влияние върху органолептичните му качества.
- >> Подходящ за включване в програми за интегрирана растителна защита.
- >> Ефективен срещу патогени, устойчиви на фениламидни фунгициди.
- >> Много кратки карантинни срокове при зеленчуци.

