

## Обща информация

ИНСЕКТИЦИД С КОНТАКТНО И СТОМАШНО ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ГОЛЯМ БРОЙ НЕПРИЯТЕЛИ ПРИ РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ.

>> **Съдържание:** 250 гр/кг метомил.

>> **Формуляция:** ВП - намокрим прах

>> **Опаковка:** 1 кг

>> Надеждно контролира широк спектър от смучещи и гризещи неприятели.

>> Ефективен през всички стадии на развитие на насекомите, има контактно и стомашно действие срещу възрастни насекоми и контактно действие върху яйцата.

>> Овоцид, ларвицид и имагоцид с бърз нокдаун ефект.

>> Бързо действие: 40 % от насекомите загиват в продължение на 15 минути, 70 % – в продължение на 1-вия час, 90 % – в продължение на 4 часа.

>> Благодарение на своето трансламинарно действие в растението, Ланат® 25 ВП контролира не само неприятелите, които се намират от горната страна на третираната листна повърхност, но и тези, които се намират от долната (нетретирана) страна на листа, както и смучещите форми, които се хранят.

>> Възможно е да се използва до 7 дни преди датата на прибиране на реколтата при плододаващи зеленчуци. Много ниска вероятност от възникване на кръстосана резистентност.

>> Устойчив на въздействие на външни фактори на околната среда. Идеално се вписва в съществуващите системи за защита на зеленчуците.

## Начин на действие

>> Ланат<sup>®</sup> 25 ВП е инсектицид от групата на карбаматите с контактно и стомашно действие върху голям брой неприятели при различни култури като инхибитор на холинестеразата. Ланат<sup>®</sup> 25 ВП е овоцид, ларвицид и имагоцид с бърз нок-даун ефект.

>> При пряк контакт Ланат<sup>®</sup> 25 ВП унищожава и яйцата на вредителите.

>> Прекият контакт с вредителите е най-ефикасната форма на контрол, но храненето върху третираната листна повърхност също оказва висок токсичен ефект върху насекомото. Вредители, които не са имали пряк допир с Ланат<sup>®</sup> 25 ВП, се контролират чрез стомашното действие на продукта.

## УСТОЙЧИВОСТ КЪМ ВЪНШНИ ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ланат<sup>®</sup> 25 ВП е устойчив на дъжд, паднал 2 часа след третирането. Ланат<sup>®</sup> 25 ВП е фотостабилен под въздействието на слънчевите лъчи.

## СЪВМЕСТИМОСТ

>> Ланат<sup>®</sup> 25 ВП добре се смесва с повечето фунгициди, инсектициди и микроторове.

>> Ланат<sup>®</sup> 25 ВП е несъвместим с Бордолезов разтвор, разтвор от вар със сяра, желязо или високо алкални разтвори.


>> Слабо алкалните разтвори е необходимо да се използват веднага след приготвянето им.

## Ефикасност срещу основни вредители

### Ефикасност срещу основни вредители



Нощенки - *Helicoverpa armigera*




■ Ланат® 25 ВП - 100 г/дка  
■ Deltamethrin - регистрирана доза

Листни въшки - *Aphis gossypii*



■ Ланат® 25 ВП - 100 г/дка  
■ Dimethoate - регистрирана доза

Тютюнева белокрылка - *Bemisia tabaci*



■ Ланат® 25 ВП - 100 г/дка  
■ Pymetrozine (250 gai/ha)

# ДюПон™ Ланат® 25 ВП - инсектицид

DU PONT

## Приложение при памук

Доза: 100 г/дка

Препоръчителен обем на работния разтвор: 10 – 40 л/дка

Карантинен срок: 14 дни

Максимален брой третирания през вегетацията: 2

Интервал на третиране: 14 дни

### За борба срещу

### Момент на приложение

Гризещи и смучещи неприятели  
(памукова листна въшка,  
памукова ноценка и др.)

При достигане на ИПВ\* на неприятелите  
ВВСН 51 – 79 (от преди начало на цъфтеж на  
културата до 90% развитие на плода)

## Препоръки за приложение

При необходимост от допълнителни третирания и с цел да се избегне развитието на резистентност, Ланат® 25ВП може да се редува с други подходящи инсектициди, с различен начин на действие, които са разрешени за тази употреба.



# ДюПон™ Ланат® 25 ВП - инсектицид



## Приложение краставици и тиквички

### Доза:

краставици (полско и оранжерийно производство): 90 - 100 г/дка

тиквички (полско и оранжерийно производство): 80 - 100 г/дка

Препоръчителен обем на работния разтвор: 30 - 100 л/дка

Карантинен срок: 7 дни

Максимален брой третириания през вегетацията: 2

Интервал на третиране: 10 - 14 дни

### За борба срещу

### Момент на приложение

Гризещи и смучещи неприятели

(листоминиращи мухи,

калифорнийски трипс,

оранжерийна белокрылка,

памукова листна въшка,

нощенки, тютюнева белокрылка и др.)

При достигане на ИПВ\* на неприятелите

От ВВСН 20 (10ти лист) до 7 дни преди

прибиране на реколтата.

## Препоръки за приложение

При необходимост от допълнителни третириания и с цел да се избегне развитието на резистентност, Ланат® 25ВП може да се редува с други подходящи инсектициди, с различен начин на действие, които са разрешени за тази употреба.



# ДюПон™ Ланат® 25 ВП - инсектицид

DU PONT

## Приложение при зелен фасул (на открито)

Доза: 80 - 100 г/дка

Препоръчителен обем на работния разтвор: 40 - 100 л/дка

Карантинен срок: 14 дни

Максимален брой третириания през вегетацията: 2

Интервал на третиране: 14 дни

### За борба срещу

### Момент на приложение

Гризещи и смучещи неприятели  
(листоминиращи мухи,  
калифорнийски трипс,  
оранжерийна белокрылка,  
нощенки и др.)

Да се третира при достигане на ИПВ на  
неприятелите, от поява на цвета до пълно  
развитие на шушуките (ВВСН 51-79).

## Препоръки за приложение

При необходимост от допълнителни третириания и с цел да се избегне развитието на резистентност, Ланат® 25ВП може да се редува с други подходящи инсектициди, с различен начин на действие, които са разрешени за тази употреба.



# ДюПон™ Ланат® 25 ВП - инсектицид

DU PONT

## Приложение при маруля

Доза: 80 - 100 г/дка

Препоръчителен обем на работния разтвор: 30 - 80 л/дка

Карантинен срок: 21 дни

Максимален брой третириания през вегетацията: 2

Интервал на третиране: 14 дни

### За борба срещу

### Момент на приложение

Гризещи и смучещи неприятели  
(листоминиращи мухи,  
калифорнийски трипс,  
оранжерийна белокрылка,  
нощенки, зелена пеперуда,  
листни въшки др.)

При достигане на ИПВ\* на неприятелите  
ВВСН 20 – 41 (от 10 същински лист до образуване  
на 10% от листната маса, характерна за сорта). Не  
по-късно от 21 дни преди прибиране на реколтата.

## Препоръки за приложение

При необходимост от допълнителни третириания и с цел да се избегне развитието на резистентност, Ланат® 25ВП може да се редува с други подходящи инсектициди, с различен начин на действие, които са разрешени за тази употреба.



# ДюПон™ Ланат® 25 ВП - инсектицид



## Приложение при пъпеши и дини

Доза: 100 г/дка

Препоръчителен обем на работния разтвор:

оранжерийно и полско производство 30 - 60 л/дка

Карантинен срок:

14 – полско производство

21 – оранжерийно производство

Максимален брой третираня през вегетацията: 2

Интервал на третиране: 14 дни

### За борба срещу

Гризещи и смучещи неприятели

(памукова листна въшка,

тютюнева белокрылка,

оранжерийна белокрылка, ношенки и др.)

### Момент на приложение

Да се третира при достигане на ИПВ на неприятелите, от 10ти лист до не по-късно от посочените карантинни срокове.

## Препоръки за приложение

При необходимост от допълнителни третираня и с цел да се избегне развитието на резистентност, Ланат® 25ВП може да се редува с други подходящи инсектициди, с различен начин на действие, които са разрешени за тази употреба.





# ДюПон™ Ланат® 25 ВП - инсектицид



## Приложение при пипер

Доза: 80 – 100 г/дка (полско и оранжерийно производство)

Препоръчителен обем на работния разтвор: 80 - 100 л/дка

Карантинен срок: 21 дни

Максимален брой третириания през вегетацията: 2

Интервал на третиране: 14 дни

### За борба срещу

Гризещи и смучещи неприятели  
(доматен миниращ молец,  
листоминиращи мухи,  
калифорнийски трипс,  
оранжерийна белокрылка,  
нощенки, прасковена листна въшка и др.)

### Момент на приложение

Да се третира при достигане на ИПВ на  
неприятелите, от 10 развити листа до пълна  
зрялост и не по-късно от посочените  
карантинни срокове (ВВСН 20-89).

## Препоръки за приложение

При необходимост от допълнителни третириания и с цел да се избегне развитието на резистентност, Ланат® 25ВП може да се редува с други подходящи инсектициди, с различен начин на действие, които са разрешени за тази употреба.



# ДюПон™ Ланат® 25 ВП - инсектицид

DU PONT

## Приложение при спанак (полско производство)

Доза: 80 – 100 г/дка

Препоръчителен обем на работния разтвор: 50 – 100 л/дка

Карантинен срок: 21 дни

Максимален брой третириания през вегетацията: 2

Интервал на третиране: 14 дни

### За борба срещу

### Момент на приложение

Гризещи и смучещи неприятели  
(листоминиращи мухи,  
калифорнийски трипс,  
оранжерийна белокрылка и др.)

Да се третира при достигане на ИПВ на неприятелите, от 10 същински лист до образуване на 10% от листната маса, характерна за сорта и не по-късно от 21 дни преди прибиране на реколтата (ВВСН 20-41).

## Препоръки за приложение

При необходимост от допълнителни третириания и с цел да се избегне развитието на резистентност, Ланат® 25ВП може да се редува с други подходящи инсектициди, с различен начин на действие, които са разрешени за тази употреба.



# ДюПон™ Ланат® 25 ВП - инсектицид



## Приложение при тютюн

Доза: 100 г/дка

Препоръчителен обем на работния разтвор: 30 – 60 л/дка

Карантинен срок: 21 дни

Максимален брой третирания през вегетацията: 2

Интервал на третиране: 14 дни

### За борба срещу

### Момент на приложение

Гризещи и смучещи неприятелни (тютюнева листна въшка, зелена прасковена листна въшка, калифорнийски трипс, тютюнев трипс, памукова ношенка и др.)

Да се третира при достигане на ИПВ на неприятелите, при удължаване на стъблото (ВВСН 20-39).

## Препоръки за приложение

При необходимост от допълнителни третирания и с цел да се избегне развитието на резистентност, Ланат® 25ВП може да се редува с други подходящи инсектициди, с различен начин на действие, които са разрешени за тази употреба.



# ДюПон™ Ланат® 25 ВП - инсектицид

The logo consists of the word "DUPONT" in a bold, sans-serif font, enclosed within an oval border.

## Приложение при домати и патладжан

Доза: 80 – 100 г/дка (полско и оранжерийно производство)

Препоръчителен обем на работния разтвор: 20 – 60 л/дка

Карантинен срок: 7 дни

Максимален брой третирания през вегетацията: 2

Интервал на третиране: 14 дни

### За борба срещу

### Момент на приложение

Гризещи и смучещи неприятели  
(листоминиращи мухи,  
калифорнийски трипс,  
белокрилки, нощенки, доматиен  
миниращ молец, листни въшки,  
царвичен стъблопробивач и др.)

Да се прилага с 20 – 60 л/дка вода. Да се третира при достигане на ИПВ на неприятелите, от 10 лист до пълна зрялост и не по-късно от 7 дни преди беритба (ВВСН 20-89).

## Препоръки за приложение

При необходимост от допълнителни третирания и с цел да се избегне развитието на резистентност, Ланат® 25ВП може да се редува с други подходящи инсектициди, с различен начин на действие, които са разрешени за тази употреба.

